



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
B型肝炎	ユニバーサル	不活化		①	②					③														(注1)	
	母子感染予防		①	②					③																
ロタウイルス	1価	生		①	②				(注2)																
	5価		①	②	③				(注3)																
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)		不活化		①	②	③						④												(注4)	
5種混合 (DPT-IPV-Hib)		不活化		①	②	③						④					7.5歳まで							15歳未満まで使用可能	
3種混合 (DPT)		不活化															① (注5)					② 11-12歳 (注6)			
2種混合 (DT)		不活化																				① 11歳	12歳		
ポリオ (IPV)		不活化															① (注7)								
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ*で初回接種する場合		不活化		①	②	③						④												(注8)	
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化		①	②	③						④					7.5歳まで							15歳未満まで使用可能	
BCG		生							①																
麻疹・風疹混合 (MR)		生												①						② (注9)					
水痘		生											①		②									(注10)	
おたふくかぜ		生																①			② (注11)				
日本脳炎		不活化															① ② ③	7.5歳まで				④ 9-12歳			
不活化インフルエンザ		不活化																						13歳以上①	
経鼻弱毒生インフルエンザ		生																						2歳以上～19歳未満に 毎年 (10月、11月などに) ① 点鼻	
新型コロナ	mRNA 不活化																							製剤により使用できる年齢が異なる	
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																				(注12)	小6	中1① ② (注13)	中2～高1相当 (注14)
	2価・4価	不活化																				(注12)	小6	中1 ① ② ③ (注13)	中2～高1相当 (注14)
ワクチン	種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		